

## PROGRAMME DE TRAITEMENT DU POMMIER

STADES	ANIMAUX	CHAMPIGNONS	ACTIONS
A B	Œufs, larves ou adultes d'insectes		Huiles parafiniques (huiles blanches)
		Spores des maladies cryptogamiques	Bouillie* bordelaise (à la chute des feuilles et avant débourrement*)
Contre toutes formes hivernantes d'insectes et de maladies, brosser (avec une brosse non métallique) les troncs et les branches charpentières pour faire tomber les mousses et les écorces mortes avant de badigeonner une couche de blanc horticole (recette p ?).			
C C3 D	Surveiller l'apparition des pucerons (observer les premiers déplacements de fourmis le long des troncs et des branches. C'est un bon indicateur) Acariens		Pulvériser des solutions de savon noir (dilution de 3 à 5 %) ou de nicotine ou de purin d'ortie. S'il n'y a pas eu d'attaque l'année précédente, les prédateurs naturels devraient suffire. Sinon : purin d'ortie ou pyrèthre.
		Tavelure et moniliose sont à redouter surtout si l'atmosphère est humide. Oïdium	Pulvériser des décoctions de prêle, (ou) et de cuivrol ou un fongicide à base de soufre.  Soufre + couper et détruire les parties atteintes
E	Poursuivre la surveillance de C - C3 - D (ligne ci-dessus) et renouveler les traitements s'ils ont été lavés par les pluies.		
F F2 G	On n'intervient pas pendant la pleine floraison (insectes pollinisateurs - coulure du pollen)		
H	Mouche de la cerise <i>Rhagoletis cerasi</i> Effectuer de nouveau les pulvérisations préventives fongicides de E - C3 - D (prêle, cuivrol ou soufre). Si Oïdium, couper et éliminer les pousses atteintes. Refaire un traitement insecticide si nécessaire (savon noir, purin d'ortie ou pyrèthre si forte attaque)		
Fin mai, début juin	S'assurer de l'absence de pucerons et (ou) de chenilles. Commencer la lutte anti carpocapse		Pucerons : idem C C3 D Chenilles : B de Thüringe Carpo : pose des pièges à phéromones et ensachage des jeunes fruits (voir p)
		Tavelure , moniliose	Continuer les mesures préventives de H, surtout s'il a plu.
Fin juin, juillet et jusqu'à la récolte	Contrôler l'absence de pucerons, chenilles* Continuer la lutte contre les carpocapses		Pucerons et chenilles (voir ci-dessus) Carpocapse : pose de bandes de carton ondulé sur les troncs. Changer le fond englué et la capsule de phéromones des pièges. Pulvérisation de Carpovirusine ou de B. de Thüringe
A la chute des feuilles		Contre toutes maladies cryptogamiques	Pulvérisation de bouillie* bordelaise En cas de forte présence de tavelure, moniliose ... effectuer une pulvérisation à la moitié de la chute.

\* Voir lexique